

НОЋ СОВА

„Чувајмо сове и њихове снове“

Понедељак

16. децембар

2019.

од 17 до 20

часова

ОШ „Вук Караџић“ – Чачак



„НОЋ СОВА 2019“

Хол ОШ „Вук
Караџић“ Чачак





Crnka (*Umbra krameri*) © Szilárd Kovács

Može se naći u pojedinim delovima siva Dunava, kao i u nižim delovima siva Dnjestra. Regulacija reka radi potreba rečne plovidbe i sve veće potrebe za navodnjavanjem poljoprivrednih kultura umanjili su broj stajajih voda i rečnih rukavaca. Crnka boravi u takvim staništima tokom plavnih perioda, koji takođe zavise od sistema kanala i brana na rekama. Odgovaranja staništa za ovu vrstu presušuju se se procenjuje da je populacija ove ribe smerjena za više od 30% u poslednjih 10 godina.



NEODENJENA	NEODOSTATNA PODATKA	MALA ZABRANITOST	POTENCIJALNO UGROŽENA	OSETLJIVA	UGROŽENA	KRAJNJE UGROŽENA	ISČEZLA U DIVLJINI	ISČEZLA
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

Moruna (*Huso huso*) © Phyllis Rachler/WWF


Za ovu ribu koja može da dostigne dužinu od 8m i težinu preko 3.000 kg smatra se da je nadživela dinosaure. Danas se može naći samo u Crnom i Kaspijskom moru i njihovim pritokama, Dunavu i Uralsu. Moruna je kritično ugrožena zbog intenzivnog ribolova radi mesa i proizvodnje kavijara od njene ikre. U Srbiji je retkost - izgradnja HE Derdap sprečava jedinke da prođu uzvodno u Dunav radi mirenja.



NEODENJENA	NEODOSTATNA PODATKA	MALA ZABRANITOST	POTENCIJALNO UGROŽENA	OSETLJIVA	UGROŽENA	KRAJNJE UGROŽENA	ISČEZLA U DIVLJINI	ISČEZLA
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

Severni vunasti majmun pauk (*Brachyteles hypoxanthus*) © kevinschafer.com

Ova vrsta živi u veoma malim i izolovanim populacijama, koje ne premašuju 500 jedinki. Ugrožavaju ga ljudi, lovcima ga radi prehrane ili iz sporta, kao i uništavanjem šuma koje nastanjuje. Lov ovih majmuna je danas u velikoj meri zaustavljen, jer su populacija retka i malobrojna, pa gubitak čak i nekoliko jedinki može imati ozbiljne posledice po njihov opstanak.



NEODENJENA	NEODOSTATNA PODATKA	MALA ZABRANITOST	POTENCIJALNO UGROŽENA	OSETLJIVA	UGROŽENA	KRAJNJE UGROŽENA	ISČEZLA U DIVLJINI	ISČEZLA
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

Beli medved (*Ursus maritimus*) © Andrew E. Derocher

Beli medvedi su uspešno prilagođeni životu u vodama Arktika. Njihov opstanak gotovo apsolutno zavisi od morskog ledenog okruženja, a populaciju ugrožavaju klimatske promene usled kojih se njihovo stanište značajno menja i nestaje i krivolov.



NEODENJENA	NEODOSTATNA PODATKA	MALA ZABRANITOST	POTENCIJALNO UGROŽENA	OSETLJIVA	UGROŽENA	KRAJNJE UGROŽENA	ISČEZLA U DIVLJINI	ISČEZLA
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

Gatalinka (*Hyla arborea*) © Katarina Paučević

Jako osjetljiva na promjene staništa, uvelike njezinog gubitka i fragmentacije, uzrokovane pri izgradnji i razvoju staništa, prirodoštetna je grabežlika. U većini delovima Europe ova bakla jedna je od najmanjih u Evropi.




POTENCIJALNO UGROŽENA	NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MALA ZABRANOST

Šargan (*Vipera ursinii macrops*) © Aleksandar Simović

Najmanje istraživana u Evropi, njena staništa su izrazito fragmentisana i ima područja naseljena manje od 2.000 km². Njegov upadanje brzo je gubitak staništa, budući da se brzo preobraćuje u intenzivno obradiva zemljišta i zemljišta za ispašu.



POTENCIJALNO UGROŽENA	NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OSETLJIVA

Apolon (*Parnassius apollo*) © Sasa Preradović

Apolon pripada vrstici vrsti drevnih leptira. Njegov broj na istom području 1.000m. Gatalinka se nalazi na istom istom području. Opatrak ovog leptira ugrožava gubitak staništa uvelike modernizacije poljoprivrede, zarastanje livada i prekomernog košanja lišće. U Srbiji je zaštićen kao rijetka, dok njegov status globalno nije procenjen po IUCN kriterijima.



POTENCIJALNO UGROŽENA	NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NEODJELJENA

Šumska kornjača (*Testudo hermanni*) © Katarina Paučević

Naslednja južna delova Europe, predstavlja staništa stacionarnog tipa. Njegov opstanak ugrožava degradacija staništa, usled toga, u većini delova južne Evrope je najmanje istraživana, dok njegov status globalno nije procenjen po IUCN kriterijima.



POTENCIJALNO UGROŽENA	NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POTENCIJALNO UGROŽENA







Aldrovanda
(*Aldrovanda vesiculosa*)
© Zvezdica izdavačka d.o.o. Zagreb



"rubi, crveni"
2019. god.

Креативне радионице
ученика I разreda
ОШ „Вук Караџић“







Ликовна
култура



www.iucnredlist.org



www.iucnredlist.org



Apolon
(*Parnasius apollo*)
© Saša Preradović

Apolon pripada široj vrsti dnevnih leptira koja se sreće na visinama preko 1.000m. Gotovo uvek se javlja na suvim kamenjarima obraslim biljkom hrasteljkom. Opstanak ovog leptira ugrožava gubitak staništa usled modernizacije poljoprivrede, zarastanja livada i prekomernog košanja li izopa. U Srbiji je zaštićen kao relikv, dok njegov status globalno nije procenjen po IUCN kriterijumima.



Šumska kornjača
(*Testudo hermanni*)
© Katarina Pauunović

Naseljiva južne delove Evrope, pretažno staništa otvorenog tipa. Njen opstanak ugrožava degradacija staništa, opadanje, ali i ilegalno sakupljanje zbog čega je brojnost nekih populacija značajno smanjena.

